

ПРОВЕРЬТЕ, ЗАЩИТИЛИ ЛИ ВЫ РЕБЕНКА ОТ ТЯЖЕЛЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ УПРАВЛЯЕМЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЙ **НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ**
РЕБЕНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИВИТ ПРОТИВ СЛЕДУЮЩИХ ИНФЕКЦИЙ



Угроза для центральной нервной системы — менингит (воспаление оболочек головного мозга)

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ	0 мес	1 мес	2 мес	3 мес	4–5 мес	6 мес	9 мес	12 мес	15 мес	18 мес	20 мес	3 года	6 лет	12–13 лет	14 лет
Пневмококковая инфекция		С 1,5 мес	V1		V2	V3				RV			Детям старше 2 лет дополнительно вакцинация 23-валентной полисахаридной вакциной		
Гемофильная инфекция типа <i>b</i>				V1	V2	V3				RV			Вакцинация здоровым детям старше 5 лет не проводится		
Менингококковая инфекция		С 1,5 мес	V1		V2	V3			1RV						V/RV



Угроза для центральной нервной системы — энцефалит (воспаление вещества головного мозга)

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ	0 мес	1 мес	2 мес	3 мес	4–5 мес	6 мес	9 мес	12 мес	15 мес	18 мес	20 мес	3 года	6 лет	12–13 лет	14 лет
Клещевой вирусный энцефалит								V1, V2				1RV через 1 год с последующей RV каждые 3 года			
Ветряная оспа							С 9 мес	V1	V2						
Корь							С 8 мес	V1					V2		
Краснуха								V1					V2		
Эпидемический паротит								V1					V2		
Грипп												Ежегодно			



Угроза для периферической нервной системы — параличи и парезы конечностей

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ	0 мес	1 мес	2 мес	3 мес	4–5 мес	6 мес	9 мес	12 мес	15 мес	18 мес	20 мес	3 года	6–7 лет	12–13 лет	14 лет
Полиомиелит				V1	V2	V3				1RV	2RV		3RV		
Столбняк				V1	V2	V3				1RV			2RV		3RV

V1, V2, V3 — порядковый номер вакцинации; 1RV, 2RV, 3RV — порядковый номер ревакцинации

□ Дети из групп риска, по показаниям

▨ Допустимый возраст начала вакцинации в соответствии с инструкцией

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЗАМЕНЯЕТ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА, ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ



Угроза остановки дыхания — апноэ

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ	0 мес	1 мес	2 мес	3 мес	4–5 мес	6 мес	9 мес	12 мес	15 мес	18 мес	20 мес	3 года	6–7 лет	12–13 лет	14 лет
Респираторно-синцициальная вирусная инфекция	5 введений с интервалом 1 мес														
Полиомиелит				V1	V2	V3				1RV	2RV		3RV		
Столбняк				V1	V2	V3				1RV			2RV		3RV
Коклюш				V1	V2	V3				1RV			2RV		3RV
Дифтерия				V1	V2	V3				1RV			2RV		3RV



Угроза для легких — пневмония (воспаление легочной ткани), бронхит, бронхиолит (воспаление бронхов, бронхиол)

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ	0 мес	1 мес	2 мес	3 мес	4–5 мес	6 мес	9 мес	12 мес	15 мес	18 мес	20 мес	3 года	6 лет	12–13 лет	14 лет
Респираторно-синцициальная вирусная инфекция	5 введений с интервалом 1 мес														
Пневмококковая инфекция		С 1,5 мес	V1		V2	V3				RV		Детям старше 2 лет дополнительно вакцинация 23-валентной полисахаридной вакциной			
Гемофильная инфекция типа <i>b</i>				V1	V2	V3				RV		Вакцинация здоровым детям старше 5 лет не проводится			
Коклюш				V1	V2	V3				1RV			2RV		3RV
Дифтерия				V1	V2	V3				1RV			2RV		3RV
Ветряная оспа							С 9 мес	V1	V2						
Корь							С 8 мес	V1					V2		
Грипп										Ежегодно					
Коронавирусная инфекция, вызванная SARS-CoV-2														V1, V2	



Угроза для уха и пазух носа — отит (воспаление уха), синусит (воспаление пазух носа)

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ	0 мес	1 мес	2 мес	3 мес	4–5 мес	6 мес	9 мес	12 мес	15 мес	18 мес	20 мес	3 года	6 лет	12–13 лет	14 лет
Пневмококковая инфекция		С 1,5 мес	V1		V2	V3				RV		Детям старше 2 лет дополнительно вакцинация 23-валентной полисахаридной вакциной			
Гемофильная инфекция типа <i>b</i>				V1	V2	V3				RV		Вакцинация здоровым детям старше 5 лет не проводится			

V1, V2, V3 — порядковый номер вакцинации; 1RV, 2RV, 3RV — порядковый номер ревакцинации

Дети из групп риска, по показаниям

Допустимый возраст начала вакцинации в соответствии с инструкцией

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЗАМЕНЯЕТ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА, ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЙ **ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА**
РЕБЕНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИВИТ ПРОТИВ СЛЕДУЮЩИХ ИНФЕКЦИЙ



Угроза для желудка и кишечника — гастроэнтерит, энтероколит
(воспаление желудка, тонкого, толстого кишечника)

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ	0 мес	1 мес	2 мес	3 мес	4–5 мес	6 мес	9 мес	12 мес	15 мес	18 мес	20 мес	3 года	6 лет	12–13 лет	14 лет	
Ротавирусная инфекция		С 1,5 мес	V1	V2	V3									Вакцинация детям старше 24 мес не проводится		
Вирусный гепатит А											V1	V2				
Дизентерия														V [#] RV каждый год		
Брюшной тиф												V [#]		RV каждые 3 года		



Угроза для печени — гепатит (воспаление печеночной ткани)

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ	0 мес	1 мес	2 мес	3 мес	4–5 мес	6 мес	9 мес	12 мес	15 мес	18 мес	20 мес	3 года	6 лет	12–13 лет	14 лет
Вирусный гепатит В	V1	V2	V3			V3		V4							
Вирусный гепатит А											V1	V2			



Угроза для поджелудочной железы — панкреатит (воспаление ткани поджелудочной железы)

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ	0 мес	1 мес	2 мес	3 мес	4–5 мес	6 мес	9 мес	12 мес	15 мес	18 мес	20 мес	3 года	6–7 лет	12–13 лет	14 лет
Эпидемический паротит								V1					V2		
Грипп													Ежегодно		
Коронавирусная инфекция, вызванная SARS-CoV-2														V1, V2	

V1, V2, V3 — порядковый номер вакцинации; 1RV, 2RV, 3RV — порядковый номер ревакцинации

— детям из групп риска однократно

■ Дети из групп риска, по показаниям

▨ Допустимый возраст начала вакцинации в соответствии с инструкцией



ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЙ **СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ** РЕБЕНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИВИТ ПРОТИВ СЛЕДУЮЩИХ ИНФЕКЦИЙ

Угроза для сердца — **миокардит** (воспаление сердечной мышцы)

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ	0 мес	1 мес	2 мес	3 мес	4–5 мес	6 мес	9 мес	12 мес	15 мес	18 мес	20 мес	3 года	6 лет	12–13 лет	14 лет
Пневмококковая инфекция		С 1,5 мес	V1		V2	V3			RV			Детям старше 2 лет дополнительно вакцинация 23-валентной полисахаридной вакциной			
Гемофильная инфекция типа <i>b</i>				V1	V2	V3				RV		Вакцинация здоровым детям старше 5 лет не проводится			
Полиомиелит				V1	V2	V3				1RV	2RV		3RV		
Корь							С 8 мес	V1					V2		
Грипп									Ежегодно						
Коронавирусная инфекция, вызванная SARS-CoV-2														V1, V2	



ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЙ **ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ** РЕБЕНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИВИТ ПРОТИВ СЛЕДУЮЩИХ ИНФЕКЦИЙ

Угроза для суставов — **артрит** (воспаление суставного аппарата)

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ	0 мес	1 мес	2 мес	3 мес	4–5 мес	6 мес	9 мес	12 мес	15 мес	18 мес	20 мес	3 года	6 лет	12–13 лет	14 лет
Пневмококковая инфекция		С 1,5 мес	V1		V2	V3				RV		Детям старше 2 лет дополнительно вакцинация 23-валентной полисахаридной вакциной			
Гемофильная инфекция типа <i>b</i>				V1	V2	V3				RV		Вакцинация здоровым детям старше 5 лет не проводится			
Краснуха								V1					V2		



ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЙ **РЕПРОДУКТИВНОЙ (ПОЛОВОЙ) СИСТЕМЫ** РЕБЕНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИВИТ ПРОТИВ СЛЕДУЮЩИХ ИНФЕКЦИЙ

Угроза бесплодия — **орхит, оофорит** (воспаление репродуктивных органов); **рак половых органов**

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ	0 мес	1 мес	2 мес	3 мес	4–5 мес	6 мес	9 мес	12 мес	15 мес	18 мес	20 мес	3 года	6 лет	12–13 лет	14 лет
Краснуха								V1					V2		
Эпидемический паротит								V1					V2		
Папилломавирусная инфекция													С 9 лет	V1, V2	V1–V3

V1, V2, V3 — порядковый номер вакцинации; 1RV, 2RV, 3RV — порядковый номер ревакцинации

■ Дети из групп риска, по показаниям

▨ Допустимый возраст начала вакцинации в соответствии с инструкцией

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЗАМЕНЯЕТ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА, ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ